

Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü

Serebral Palsi'nin Belirtileri

- 4. ayda başını tutamıyorsa
- 4. ayda elleri kapalı ve başparmakları avuç içerisindeyse
- 6. ayda ayaklarını ağızına götüremiyorsa
- 6. aydan sonra başparmakları avuç içerisinde hareket ediyorsa
- 8. ayda bir elini diğer eline göre daha fazla kullanıyorsa
- 8. ayda dirsekleri düz bir şekilde kendini yerden yükseltip başını ve üst gövdesini kaldıramıyorsa
- 10. ayda her iki elini orta hatta getiremiyor ve objeleri orta hatta tutamıyorsa
- 10. ayda bağımsız oturamıyor ve emeklemiyorsa
- 12. ayda kanepeden tutunarak ayağa kalkamıyorsa
- 14. ayda tek başına ayağa kalkamıyorsa
- 18. ayda bağımsız yürüyemiyorsa 30. ayda bağımsız merdiven inip çıkamıyor ve zıplayamıyorsa ailenin çocuk nöroloji uzmanına başvurması önerilir.

Kaynakça: Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler "Aileler İçin Rehber Kitapçık



BAKRAM
Bakırköy Rehberlik ve
Araştırma Merkezi

Bakırköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü

Serebral Palsi'nin Nedenleri

Doğum Öncesi Nedenler

- Kan uyuşmazlığı
- Enfeksiyonlar
- Metabolik hastalıklar (Şeker hastalığı, yüksek tansiyon vb.)
- Dokuların oksijensiz kalması (Karbonmonoksit zehirlenmesi, anemi, hipotansiyon, kordon dolanması)
- Kanamalar (anneye ait zehirlenmeler, travma ve kanamalar)
- Annenin yaşı (16 yaşından küçük veya 40 yaşından büyük)
- Kalıtsal nedenler



Doğum Sırasındaki Nedenler

- Erken doğum (34 haftadan önce doğumlar)
- Düşük doğum ağırlığı (≤ 1500 gr) • Zor doğum
- Şiddetli sarılık
- Oksijensiz kalma
- Nefes alamama
- Çoğul gebelik
- Forseps kullanımı

Doğum Sonrası Nedenler

- Enfeksiyonlar
- Kazalar
- Tümöral nedenler
- Zehirlenmeler
- Kanamalar
- Travmalar



BAKRAM
Bakırköy Rehberlik ve
Araştırma Merkezi